


Какво трябва да знаете за **Regkirona**™



Какво е **Regkirona**™?

Препаратът Regkirona™ беше идентифициран като потенциално лечение за COVID-19 чрез скрининг на кандидати за антитела, от които показва най-висока ефективност при неутрализиране на вируса SARS-CoV-2. Препаратът Regkirona™ блокира свързването на SARS-CoV-2 с ACE2 рецептора и следователно предотвратява навлизането на вируса в човешките клетки.

За какво се използва **Regkirona**™?

Препаратът Regkirona™ е предназначен за лечение на възрастни с **потвърден COVID-19**, при които не е необходим допълнителен кислород, и които са с **повишен риск** от прогресиране на COVID-19 до тежка форма. Препаратът Regkirona™ получи разрешение за употреба в ЕС от Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Какво е COVID-19?³

COVID-19 е инфекциозно заболяване, причинено от вирус, наречен Тежък остър респираторен синдром Коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Вирусът се разпространява, когато някой с вируса отделя дихателни капчици и тези капчици се озовават в устата, носа или очите на човек наблизо.


Някои признаци и симптоми на COVID-19 включват треска, кашлица, умора и задых. Тежестта на тези симптоми може да варира от лека до тежка форма.




Треска



Кашлица



Умора



Задых

По-възрастните хора или тези, които имат съществуващи хронични заболявания, може да имат по-висок риск от сериозно заболяване.

Говорете със здравен специалист по телефона, ако имате притеснения относно вашите лекарства или симптоми.

Как действа **Regkirona**™?

- Намалнява степента на прогресия до тежка форма на COVID-19 при пациенти с лека до умерена степен на вируса
- Намалнява времето до клинично възстановяване
- Намалнява вирусния товар и съкращава времето до отрицателна конверсия
- Намалнява скоростта на прогресия на заболяването при високорискови групи и помага на пациентите да се върнат към ежедневиия живот⁴



Кога да приемате Regkirona™¹

Препарата Regkirona™ трябва да се приложи **до 7 дни от появата на симптоми на COVID-19.**



Как да приемате Regkirona™¹

Препарата Regkirona™ се прилага като еднократна интравенозна инфузия от 40 mg/kg. Моля, следвайте инструкциите, предоставени от вашия здравен специалист.

Преди инфузията

Процедурата може да отнеме общо 2-3 часа, така че предвидете повече свободно време.

По време на инфузията

Препарата Regkirona™ Ви се влива от медицинска сестра или лекар като интравенозна инфузия, продължаваща 60 минути.

След инфузията

Вашата медицинска сестра или лекар може да ви препоръча да останете в болницата или инфузионния център поне един час, за да Ви проверят състоянието. Можете да напуснете болницата или инфузионния център, когато здравния специалист Ви разреши да го направите.



Какви са страничните ефекти от Regkirona™¹

Въпреки че са съобщени като нечести (може да засегнат до 1 на 100 души), може да получите алергични реакции, дължащи се на инфузията, включително свръхчувствителност и анафилактия. Може също да получите често срещани алергични или други реакции със симптоми, включително:

- Треска
- Втрисане
- Умора
- Объркване
- Главоболие
- Сърбеж
- Мускулни болки
- Световъртеж
- Потене
- Затруднено дишане
- Хрипове
- Недостиг на въздух
- Ниско ниво на кислород в кръвта
- Ниско или високо кръвно налягане
- Дискомфорт или болка в гърдите
- Обрив
- Неравномерен, бърз или бавен сърдечен ритъм
- Подуване на лицето, устните или гърлото (ангиоедем)
- Слабост
- Повръщане (гадене)

Ако получите някакви странични реакции по време на или след инфузията, незабавно уведомете Вашата медицинска сестра или лекар.

Нежеланите реакции трябва да бъдат докладвани директно на Изпълнителната агенция по лекарствата.

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg



Какво трябва да имате предвид преди да приемете Regkirona™¹

Преди да приемете това лекарство, трябва да уведомите Вашия здравен специалист ако:

- Имате сериозни заболявания
- Имате алергии
- Приемате лекарства (предписани, без рецепта, витамини и билкови продукти)
- Кърмите или планирате да кърмите
- Сте бременна или планирате забременяване*

*Препарата Regkirona трябва да се прилага само ако потенциалните ползи от лечението надвишават потенциалните рискове за майката и нероденото дете. Трябва да обсъдите с Вашия лекар дали трябва да приемате това лекарство.